


予防接種名	接種期間	標準的な接種期間	接種回数・間隔		予診票発送時期
ロタウイルス ※令和2年8月1日以後に生まれた人 ※接種するワクチンにより、接種回数が異なります。	●ロタリックス(1価) 出生6週0日後～出生24週0日後まで ●ロタテック(5価) 出生6週0日後～出生32週0日後まで	初回接種については、生後2か月～出生14週6日後まで	2回	27日以上の間隔をあけて2回接種	生後2か月前に ※「予防接種綴り」を個別通知
		初回接種については、生後2か月～出生14週6日後まで	3回	27日以上の間隔をあけて3回接種	
B型肝炎	1歳未満	生後2か月～9か月未満	3回	1回目から27日以上の間隔をおいて2回目、1回目から139日以上の間隔をおいて3回目を接種	生後2か月前に ※「予防接種綴り」を個別通知
ヒブ	生後2か月～5歳未満 * 接種開始年齢で接種回数は異なります	接種開始年齢 生後2か月～7か月未満 (標準的な接種年齢)	1～4回		生後2か月前に ※「予防接種綴り」を個別通知
			初回: 3回	27日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種 * 初回2回目、3回目は1歳未満に行う	
			追加: 1回	初回接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔で1回接種	
			初回: 2回	27日以上、標準的には56日までの間隔で2回接種 * 初回2回目は1歳未満に行う	
追加: 1回	初回接種終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔で1回接種				
1歳～5歳未満	1回				
小児用肺炎球菌	生後2か月～5歳未満 * 接種開始年齢で接種回数は異なります	接種開始年齢 生後2か月～7か月未満 (標準的な接種年齢)	1～4回		生後2か月前に ※「予防接種綴り」を個別通知
			初回: 3回	27日以上の間隔をあけて、標準的には生後12か月までに3回接種 * 初回2回目3回目は2歳未満に行う * 初回2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない	
			追加: 1回	初回接種終了後60日以上の間隔をあけて1歳以降、標準的には1歳～1歳3か月に1回接種	
			初回: 2回	27日以上の間隔をあけて標準的には生後12か月までに2回接種 * 初回2回目は2歳未満に行う	
			追加: 1回	初回接種終了後、60日以上の間隔をあけて1歳以降に1回接種	
			1歳～2歳未満	2回	
2歳～5歳未満	1回				
・4種混合 (ジフテリア 破傷風 百日せき 不活化ポリオ)	生後3か月～7歳6か月未満 * 3種混合ワクチン及び不活化ポリオワクチンを接種している方は接種の必要はありません	生後3か月～1歳未満	初回: 3回	20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種	生後2か月前に ※「予防接種綴り」を個別通知
		初回(3回)接種終了後から1年～1年6か月未満	追加: 1回	初回(3回)接種終了後6か月以上の間隔をあけて1回接種	

予防接種名	接種期間	標準的な接種期間	接種回数・間隔		予診票発送時期
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳～13歳未満	11歳	1回		11歳の誕生月の前月の月末に個別通知
・3種混合 (ジフテリア 破傷風 百日せき)	生後3か月～7歳6か月未満 *4種混合ワクチンを接種している方は接種の必要はありません	生後3か月～1歳未満	初回:3回	20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種	市内委託医療機関でお受け取りください。
		初回(3回)接種終了後から1年～1年6か月未満	追加:1回	初回(3回)接種終了後6か月以上の間隔をあけて1回接種	
不活化ポリオ	生後3か月～7歳6か月未満 *経口生ポリオワクチンを2回接種している方は接種の必要はありません *4種混合を接種する方は接種の必要はありません。	生後3か月～1歳未満	初回:3回	20日以上、標準的には56日までの間隔で3回 *経口生ポリオワクチンを1回接種している方は2回	市内委託医療機関でお受け取りください。
		初回(3回)接種終了後から1年～1年6か月未満	追加:1回	初回(3回)接種終了後6か月以上の間隔をあけて1回接種	
BCG	1歳未満	生後5～8か月未満	1回		生後2か月前に ※「予防接種綴り」を個別通知
麻しん風しん混合	1期:1歳～2歳未満	1期:1歳になったらできるだけ早いうちに	1回		生後10か月頃、「10か月児赤ちゃん広場」で配布
	2期:小学校就学前の1年間		1回		令和2年3月末に個別通知
水痘	1歳～3歳未満	1回目接種は生後12か月～15か月未満	2回	3か月以上、標準的には6か月～12か月までの間隔をあけて2回接種 ・すでに水痘に罹患したことがある方は対象とはなりません。	生後10か月頃、「10か月児赤ちゃん広場」で配布
日本脳炎	1期:生後6か月～7歳6か月未満	3歳	初回:2回	6日以上、標準的には28日までの間隔をあけて2回接種	生後2か月前に ※「予防接種綴り」を個別通知
		4歳	追加:1回	初回(2回)接種終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をあけて1回接種	
	2期:9歳～13歳未満	9歳	1回		9歳の誕生月の前月の月末に個別通知
	*特例対象者: 積極的勧奨の差し控えにより予防接種を受ける機会を逸した方 ①平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日の間に生まれた方 ②平成19年4月2日生まれから平成21年10月1日生まれで平成22年3月31日までに第1期が終了していない方	(接種期間) ①20歳未満 ②生後9歳～13歳未満	定期接種の不足分の回数	接種間隔は医療機関でご相談ください	①②対象者:特例対象として初めて開始される方は母子保健課、接種を開始している方は市内医療機関でお受け取りください。
子宮頸がん予防	小学校6年生～高校1年生相当の女子	13歳になる年度(中学1年生)	3回	ワクチンの種類によって接種間隔は異なりますので、医療機関でご相談ください	平成25年6月より、積極的勧奨を差し控えています。接種をご希望の方は市内委託医療機関でお受け取り下さい。

※「予防接種綴り」の内容…ロタ(3枚)、B型肝炎(3枚)、ヒブ(4枚)、小児用肺炎球菌(4枚)、4種混合(4枚)、BCG、日本脳炎第1期(3枚)

◆ワクチンの種類と他の予防接種との間隔 *定められた間隔で接種してください



◆同じ種類のワクチンを接種する場合の接種間隔
同じ種類のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は、従来通りですのでご注意ください。

(例) B型肝炎ワクチンの場合

- ・ 1回目と2回目の接種間隔は、27日以上あける
- ・ 3回目は、1回目の接種から139日以上あける